

DIRİM

kültür - sanat - güncel yaşam



Pence-i Âl-i Abâ (Fahname'den, Topkapı Sarayı Müzesi)

Anti-enflamatuvar Analjezik Anti-Flogistik

DOĞANIN YARATTIĞI MUCİZE

Aescin (Amorf) 0.4g + Dietilamin Salisilat 2.0g



- Doğal kaynaklı bir jeldir
- İşlev kaybını en aza indirir
- Deriye hızla penetre olur
- Bağ dokusu temelini rejenere eder
- Etkisi uzun sürelidir
- Serinletici etkiye sahiptir
- Hoş kokuludur
- Leke bırakmaz
- Süratli ve etkin tedavi sağlar

Formülü: 40g jel formülü, **Etken Madde:** Aescin (amorf) 0,4g Dietilamin salisilat 2,0g. **Yardımcı madde:** Lavanta yağı, neroli yağı ve isopropil alkol.
Farmakolojik Özellikleri: Alkol vasat içerisinde özel formülü ile antiödematöz, anti-enflamatuvar ve analjezik etkiye sahiptir. Aescin (amorph) deriden emilir, dokudaki sıvı birikimini durdurur ve dokunun şişmesini önler. Çarpma ve darbelerden oluşan lokal şişmeler hızlı bir şekilde elimine edilir. Salisilik asit etesini, anti-enflamasyon etkiyi artırır ve derin ağrıları azaltmak için tam olarak etkilidir. PrepaGel transparandır ve süratle emilir. **Endikasyonları:** Antieksudatif, anti-flojistik ve analjezik olarak travma sonucu oluşan ezik, çürük, distorsiyon, hematam ve tendosinovit durumları, omurga kemiği ağrıları, servikal sendrom, boyun ağrısı, lumbago, sıyatik vakalarında endikedir. **Kontrendikasyonları:** Birleşimindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığı olanlar ile 2 yaşından küçük ve emen çocuklarda kontrendikedir. **Uyarılar/Önlemler:** Açık yaralara ve ışın tedavisi gören deriye uygulanmamalıdır. **Yan etkiler/Advers Etkiler:** Çok nadir durumlarda cilt reaksiyonu olabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. **Kullanım Şekli ve Dozu:** Herhangi bir kullanım yolu önerilmemişse gerekli yere günde bir kere veya bir kaç kere ince bir tabaka halinde sürülür. Masajla uygulanabilir, arzu edilirse yapılabilir. Tedavi süresi, şikayetler bitinceye kadar kullanılabilir. Ancak geniş yüzeyde kullanımda etken maddelere ait etkiler göz ardı edilmemelidir. **Saklama Koşulları:** 30 °C altındaki oda sıcaklığında, terahan sonra yerde saklanmalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerde ve ambalajında saklayınız. Doktora danışmadan kullanmayınız. İlaçları son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. **Ticari Takdim Şekli ve Ambalajı:** 40 g'lık alüminyum tüp. **%18 K.D.V. dahil P.Ş.F. 3.305.000 TL (Kasım 2002). Ruhsat Sahibi: Dr.F.Frik ilaç San. ve Tic. Ltd. Şti. İSTANBUL. Ruhsat Tarih ve No: 07.1997 - 183/93. İmal Yeri:** Plantafarma Bitkisel İlaç San. A.Ş. Düzce. **Reçete ile satılır.**