

|  |   |
|--|---|
| <p>12-15 Şubat 2004<br/>1. Üst Solunum<br/>Yolu İnflamasyonları Sempozyumu<br/>KAYSERİ<br/>Hilton Otel<br/>Düzenleyen:<br/>Türk Rinoloji Derneği ve<br/>Otorinolarinoloji Derneği<br/>Dr. Oğuz Öğretmenoğlu<br/>Tel: (0312) 310 41 11<br/>E-mail: oguz@tr.net<br/>www.usyo2004.org<br/>Organizasyon:<br/>Serenas Turizm<br/>Tel: (0312) 467 69 91<br/>www.serenas.com.tr</p> | <p>3-7 Mart 2004<br/>Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi<br/>ERZURUM<br/>Organizasyon:<br/>Serenas Turizm<br/>Tel: (0312) 467 69 91<br/>E-mail: barikan@serenas.com.tr<br/>www.serenas.com.tr</p>   |
| <p>20-21 Şubat 2004<br/>3. Ege Diz Cerrahisi<br/>Artroskopi Günleri<br/>AYDIN<br/>Korumar Hotel Kuşadası<br/>Düzenleyen:<br/>Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve<br/>Diz Cerrahisi Derneği<br/>Organizasyon: United Expo<br/>Tel: (0232) 465 00 85<br/>Faks: (0232) 465 00 86<br/>www.unitedexpo.com.tr</p>  | <p>4-6 Mart 2004<br/>2. Ulusal CMV Sempozyumu<br/>1. Ulusal Herpes Virus Sempozyumu<br/>ANTALYA<br/>Düzenleyen:<br/>Akdeniz Üniversitesi<br/>Organizasyon:<br/>Dekon Kongre &amp; Turizm<br/>Tel: (0212) 274 93 30<br/>www.dekon.com</p>  |
| <p>23-25 Şubat 2004<br/>Koruma Altındaki Çocuklar Sempozyumu<br/>ANKARA<br/>Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi<br/>Morfoloji Salonu<br/>Düzenleyen:<br/>Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi<br/>Tel: (0312) 362 30 30 / 6609</p>  | <p>4-7 Mart 2004<br/>Uludağ KBB 2004 Günleri<br/>BURSA<br/>Grand Yazıcı Hotel<br/>Düzenleyen:<br/>Uludağ Üniversitesi KBB Anabilim Dalı,<br/>Bursa KBB Derneği<br/>Tel: (0224) 442 83 03<br/>E-mail: kbb@uludag.edu.tr<br/>www.uludag2004kbb.org<br/>Organizasyon:<br/>Plaza Turizm Kongre Organizasyon A.Ş.<br/>Tel: (0224) 234 58 58 (pbx)<br/>www.plazatur.com</p> |
| <p>25-28 Şubat 2004<br/>2. Başağrısı Kış Okulu<br/>ANTALYA<br/>Sunrise Quenn Hotel</p>   |   |

Antienflamatuar, Analjezik, Anti-Flogistik

# DOĞANIN YARATTIĞI MUCİZE

Aescin (Amorf) 0.4g+Dietilamin Salisilat 2.0g



## PREPAGEL *jel*



- ~ Doğal kaynaklı bir jeldir
- ~ İşlev kaybını en aza indirir
- ~ Deriye hızla penetre olur
- ~ Bağ dokusu temelini rejenere eder
- ~ Etkisi uzun sürelidir
- ~ Serinletici etkiye sahiptir
- ~ Hoş kokuludur
- ~ Leke bırakmaz
- ~ Süratli ve etkin tedavi sağlar

**Formülü:** 40g jel; **Etkin Madde:** Aescin (amorf) 0.4g, Dietilamin salisilat 2.0g. **Yardımcı Madde:** Lavanta yağı, neroli yağı ve isopropil alkol. **Farmakolojik Özellikleri:** Alkol vasat içerisinde öz formülü ile antiödematöz, antienflamatuar ve analjezik etkiye sahiptir. Aescin (amorf) deriden emilir, dokudaki sıvı birikimini durdurur ve dokunun şişmesini önler. Çarpma ve darbelerden oluşan lokal şişmeler hızlı bir şekilde elimine edilir. Salisilik asit bileşeni, antienflamatuar etkiyi artırır ve derin ağrıları azaltmak için tam olarak etkilidir. Prepapel jel transparandır ve süratle emilir.

**Endikasyonları:** Antiöksüdatif, antiinflamatuar ve analjezik olarak travma sonucu oluşan ezik, çürük, distorsiyon, hematom ve tendosinovit durumları, omurga kemiği ağrıları (servikal sendrom), boyun ağrısı, lumbago, sırttaki vakalarında endikedir. **Kontrendikasyonları:** Birleşimindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığı olanlar ile 2 yaşından küçük ve emen çocuklarda kontrendikedir.

**Uyarılar/Önemler:** Açık yaralara ve ısın tedavisi gören deriye uygulanmamalıdır. **Yan Etkiler/Advers Etkiler:** Çok nadir durumlarda cilt reaksiyonu olabilir. **BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.** **Kullanım Şekli ve Dozu:** Herhangi bir kullanım yolu önerilmemişse gerekli yere günde bir kere veya birkaç kere ince bir tabaka halinde sürülür. Masaj gerekmez, arzu edilirse yapılabilir. Tedavi süresi; şikayetler bitinceye kadar kullanılabilir. Ancak geniş yüzeyde kullanımda etkin maddelere ait etkiler göz ardı edilmemelidir. 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında, tercihen serin yerde saklanmalıdır. Çocukların erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız. Doktorla danışmadan kullanmayınız. İlaçları son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. **Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj:** 40g'lık alüminyum tüp. **Ruhsat Tarihi ve No:** 25.07.1997 - 183/93 **Ruhsat Sahibi:** Dr. F. Frık İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. İSTANBUL. İmal Yer: Plantafarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. DÜZCE. Reçete ile satılır.



# dicetel®

Pinaverium Bromide 50 mg

## İBS Semptomlarına Karşı Sihirli Etkinlik



- İlk olarak 1975 yılında kayıtlara geçmiştir ve her yıl dünyada ortalama 3 milyon hastada reçetelenmektedir.
- Gastrointestinal sistem selektif kalsiyum antagonistisi olarak hücre içi kalsiyum kanallarını kapatır.
- Oral olarak uygulandıktan sonra çok az miktarda emilir, sistemik dolaşıma çok az miktarda geçer.
- Atılımı karaciğer ve safra yolları üzerindedir.
- Tolerabilitesi plaseboya eşdeğerdır.<sup>(1)</sup>
- Abdominal ağrı ve meteorizmin giderilmesinde Trimebutin'den daha etkilidir.<sup>(2)</sup>
- Antikolinergik ilaçlarda izlenen yan etkilerin hiçbiri oluşmamıştır.<sup>(3)</sup>
- Kardiyovasküler parametreler üzerine etkisi yoktur.<sup>(4)</sup>
- Glukom ve prostat hipertofisi hastalarında güvenle kullanılabilir.<sup>(5)</sup>



**Formülü:** 1 film tablet. **Aktif Madde:** 50 mg Pinaverium Bromid. **Yardımcı Madde:** Sunset Yellow, titandiyoksit. **Farmakolojik Özellikleri:** Dicetel (aktif madde olan Pinaverium Bromid) gastrointestinal kanal üzerine selektif olarak etki yapan antispazmodik ve muskülerotropik maddelerdir. Kalsiyum antagonistisi özellikleri vardır. Mide sekreyasyonunu hacmini değiştirmeden azaltıcıdır. Mide boşalmasını geciktirir. Dicetelde antikolinergik tipte yan etkiler yoktur bu nedenle glukomu ve prostat hastalarında da kullanılır. Kalp üzerine hemodinamik veya elektrofizyolojik etki yoktur. Pinaverium Bromid'in gastrointestinal kanaldan emilimi az olur, en yüksek serum konsantrasyonuna 1 saate varılır. Atılım safra yolu ile olur. Eliminasyon yarı ömrü 3-4 saattir. Plazma proteinlerine %98 oranında bağlanır. **Endikasyonları:** İrritabl kolon sendromu, spastik kolon, mukulu kolitis ve bunların semptomları, karın ağrısı, spazm ve fonksiyonel gastrointestinal şikayetlerde, rahatsız edici hareketlilikte. Barsak rahatsızlıklarının ve düzenlenemeyen semptomatik tedavisinde. Safra kesesi diskinetizmi ve teknik gastrointestinal araştırmalarda; baryum geçici, endoskopik safra kanalı pankreatografiye hazırlık olarak, baryum lavmanı ve kolonoskopi esnasında spazm, hareketlerde rahatsızlık ve ağrıyı önlemek üzere kullanılır. **Kontraindikasyonları:** Gastrointestinal bölgede obstrüktif rahatsızlıklar (akalaziya, pilor stenozu), paralişik ileus, yağlı veya zeka geriliği olan hastalarda intestinal stenoz, ciddi ülseratif kolitis, ülseratif kolitise neden olan toksik megakolon, miyastenia gravis ve etken maddede aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. **Uyarılar/Önemli Notlar:** Doktoru danışmadan kullanılmamalıdır. Sadece erişkinler kullanılabilir. Tabletler kurutulmalıdır. Tabletler çiğnenmeden su ile yemek esnasında yutulmalıdır. **Hanifelerde, Emzikkiler ve Çocuklarda Kullanımı:** Hamilelikte Kullanımı: Hamyarlarda, Pinaverium Bromid ile teratojenite çalışmaları yapılmıştır. Herhangi bir fetal anomalik gözlemlenmiştir. Buna rağmen Dicetel emniyet açısından hanif kadınlara verilmemelidir. **Emziren Anneler:** İnsan sütüne ilaon geçişi bilinmemektedir. Pek çok ilaç insan sütüne geçmesi nedeni ile emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır. **Çocuklarda Kullanımı:** Etkinliği ve güvenliliği kanıtlanmadığından çocuklarda kullanılmamalıdır. **Yan Etkiler/Advers Etkiler:** Dicetelin istenmeyen etkileri nadirdir. Gastrik rahatsızlık, ağza kuruluğu ve konstipasyon, çok nadir minor sindirim rahatsızlıkları yapabilir. Pek çok vakalarda, bunların Dicetel ile bir bağlantısı olmadığı bildirilmiştir. Çünkü bu semptomlar hastalıkla bağlantılıdır. Normal kullanım şartlarında lokal ülsere veya irritasyona neden olan özafagus yazma olayı meydana gelmez. Ancak hastanın kullanım şekli dikkatle izlenmelidir. **BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.** İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler: Klinik çalışmalar Dicetelin; Digitalis veya Digoxin, oral antidiyabetikler, insülin, kumarinler ve heparinle hiç bir etkileşimi olmadığını gösterir. **Kullanım Şekli ve Dozu:** Genelikle günlük doz 3 tablettir. Yemek esnasında günde 3 defa 1'er tablet çiğnenmeden su ile yutulur. Doz doktor tavsiyesi ile hastanın ihtiyacına göre ayarlanabilir. **Doz Aşımı ve Tedavisi:** Akut doz aşımı durumunda henüz absorbe edilmiş ilaç gastrointestinal kanaldan uzaklaştırılır. Gerekiirse semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. **Saldama Koşulları:** Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, ambalajında ve 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. **Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:** 40 film tablet blister ambalajı. **Ruhsat Sahibi:** Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul. **Ruhsat Tarihi ve No:** 23.06.1993-164/85. **İmal Yeri:** Yeni İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Esenyurt-İstanbul. **Reçete ile satılır.**

**Referanslar:** 1- Virat J., Hueber D. - Douleur du colopathe et Dicetel®. La Pratique Médicale 1987; 43: 32-34. 2- Di Simone A., Platano G., Politi C. - Il bromuro di pinaverina nel trattamento del colon irritabile. Min. Diet. Gastroenterol 1981; 27: 579-584. 3- Levy C., Charbonnier A., Cachin M. - Bromure de Pinaverium et Colopathie Fonctionnelle (Étude à double insu). Sem. Hôp. Paris Thérapeutique 1977; 33 (7-8): 372-374. 4- Guerot C., Khemache A., Sebba J., Noel B. - Electrophysiological study of intravenous pinaverium bromide in cardiology. Curr. Med Res Opin 1988; 11(2): 73-79. 5- Roux JJ., Salmon D., Reny A. - Emploi d'un antispasmodique musculotrope chez le glaucomeux. Gaz. Méd. de France 1980; 87: 1033-1036.

