


# MAYIS SIKINTISI

Senaryo

**NURİ BİLGE CEYLAN**



çıkan filmde türetilmedi. Çekim öncesi yönetmenin elinde bulunan senaryo hiç değiştirilmeden aynen okura sunuluyor. Böylece filmi izleyenler, yönetenin çekim ve montaj sırasında ne tür değişikliklere gereksinim duyduğunu açıkça görebilecek.

Bir senaryoyu bu gözle okumak, bir filmin oluşumundaki evreleri, değişiklikleri, tereddütleri, buluşları bu gözle izlemek, her filmin gördüğümüzün dışında bir ya da birkaç öteki filmi de barındırdığını fark etmemizi sağlayacaktır. Sinema sanatının en yalın örneklerinden biri olan Mayıs Sıkıntısı'nın çekim senaryosunu bu öteki filmleri merak edip görmek isteyenler için yayımlıyoruz. Bazı filmler "kes" komutunun geciktirildiğini düşündüğümüz an başlar, sıkıntının kendini usulca hissettirdiği an... İzleyicinin kendine bakmaya başladığını fark ettiği an...

Norgunk Yayıncılık  
Tel: 0212 351 48 38  
e-mail: norgunkyayincilik@yuboo.com

Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinde gökyüzü ve bulutların durumu çok önemlidir. Eğer Kasaba'da bütün mevsimleri görebildiysek, Koza'da rüzgarı, Mayıs Sıkıntısı'nda sıkıntının tüm hallerini görebildiysek, bunu yönetmenin belleğine kazınmış bir duyguyu aktarabilecek görüntüleri sabırla, ısrarla beklemiş olmasına borçluyuz. Diyaloglar, sahneler, oyuncular değişebilir, ama gökyüzü ve bulutlar senaryoda düşünüldüğü gibi olacaktır. Yayımladığımız Mayıs Sıkıntısı senaryosu ortaya





# Cabral®

Fenitramidol HCl  
Miyorelaksan ve Analjezik

## kaslar şimdi...

## ...DAHA ESNEK

BOYUN, BEL, SIRT VE

YUMUŞAK DOKU

HASTALIKLARINDAN

KAYNAKLANAN

MİYALJİLERDE TEK

ETKEN MADDE İLE...

## KAS GEVŞETİCİ VE AĞRI KESİCİ ETKİ!



### Cabral® 3 Ampul x 3 ml

**Farmatül:** 3 ml'lik 3 ampul. **Etkin Madde:** 800mg Fenitramidol HCl. **Yardımcı Madde:** Sodyum hidroksit 2,73mg, distile su q.s. 3.0ml. **Farmakolojik Özellikleri:** Cabral, beyin ve medulla spinalate polisinaptik refleksleri baskılayıcı etkiye sahiptir, ağrı-kasılma zincirini yolar. Bu nedenle adale gerginliğini giderir, adale ağrılarında kuvvetli analjezik etki yapar. Monosinaptik refleksleri etkilemez. Miyorelaksan ve analjezik olarak Cabral, güçlü adale ve hareket zeminini diğer yapılarında akut ve kronik ağrıların tedavisinde endikedir. **Endikasyonları:** Bel ağrısı, kumbaz, sırtık, disk rahatsızlıkları ve medulla spinalate ve sinaptik, medulla ve spinal kordun diğer bölümlerinde de etkisizdir. **Kontraindikasyonları:** Bilinmemektedir. **Uyarılar/Önemli:** Cabral adale zayıflama ve tahammül edilebilir. **Nadir olarak** zehirlenme semptomları gözlemlenmiştir. Bu sebeple zehirlenme semptomları 102-114 saat sürdüğü takdirde tedavi edilmelidir. Cabral adale zayıflama ve tahammül edilebilir. **BÖLÜNMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZLA İLAJ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:** Cabral, kumarin türevleri, toluen ve diğer anesteziklerle birlikte kullanılmamalıdır. **Kullanım Şekli ve Dozaj:** Gözde 1 ampul günde üç kez alınmalıdır. **Amputasyon:** Amputasyon sonrası ağrıların tedavisinde Cabral 3 ml'lik 3 ampul kullanılmaktadır. **Amputasyon:** Amputasyon sonrası ağrıların tedavisinde Cabral 3 ml'lik 3 ampul kullanılmaktadır. **Ruhsat Tarihi ve No:** 11.11.1970 - 105/14. **Ruhsat Sahibi:** Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. A.Ş. İSTANBUL. **İmal Yeri:** Mimar İlaç San. A.Ş. Kartal/İSTANBUL. **Reçete ile satılır.**

**Referanslar:**  
1. Thomas S O'Dell. Pharmacology of Phenitramidol with emphasis on analgesic and muscle-relaxant effects. Reprinted from Annals of The New York Academy of Sciences. Vol 86. Art. 1. Pg. 191-202, 1960.  
2. Peter F. Siegel, M.D., Joseph A. FABIANI, M.D. and John H. Zimrod, M.D.  
- Double-blind Comparison of Intramuscular Phenitramidol and Placebo in Acute Musculoskeletal Pain Syndromes. Section of Clinical Pharmacology, Department of Medicine and Section of Orthopedics, Department of Surgery, Hahnemann Medical College and Hospital, Philadelphia. Current Therapeutic Research Vol 9, No. 1, Jan. 1967.



### Cabral® 24 Draje

**Farmatül:** 1 adet. **Etkin Madde:** 400mg Fenitramidol HCl. **Yardımcı Madde:** Tartrazin, hidroksit, su şeker. **Farmakolojik Özellikleri:** Cabral, beyin ve medulla spinalate polisinaptik refleksleri baskılayıcı etkiye sahiptir, ağrı-kasılma zincirini yolar. Bu nedenle adale gerginliğini giderir, adale ağrılarında kuvvetli analjezik etki yapar. Monosinaptik refleksleri etkilemez. Miyorelaksan ve analjezik olarak Cabral, güçlü adale ve hareket zeminini diğer yapılarında akut ve kronik ağrıların tedavisinde endikedir. **Endikasyonları:** Bel ağrısı, kumbaz, sırtık, disk rahatsızlıkları ve medulla spinalate ve sinaptik, medulla ve spinal kordun diğer bölümlerinde de etkisizdir. **Kontraindikasyonları:** Bilinmemektedir. **Uyarılar/Önemli:** Cabral adale zayıflama ve tahammül edilebilir. **Nadir olarak** zehirlenme semptomları gözlemlenmiştir. Bu sebeple zehirlenme semptomları 102-114 saat sürdüğü takdirde tedavi edilmelidir. Cabral adale zayıflama ve tahammül edilebilir. **BÖLÜNMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZLA İLAJ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:** Cabral, kumarin türevleri, toluen ve diğer anesteziklerle birlikte kullanılmamalıdır. **Kullanım Şekli ve Dozaj:** Gözde 3 kez 1-2 draje, yemeklerden sonra günde üç kez alınmalıdır. **Amputasyon:** Amputasyon sonrası ağrıların tedavisinde Cabral 3 ml'lik 3 ampul kullanılmaktadır. **Amputasyon:** Amputasyon sonrası ağrıların tedavisinde Cabral 3 ml'lik 3 ampul kullanılmaktadır. **Ruhsat Tarihi ve No:** 11.11.1970 - 105/14. **Ruhsat Sahibi:** Dr. F. Frik İlaç San. ve Tic. A.Ş. İSTANBUL. **İmal Yeri:** Yenyol, Horozmeda San. ve Tic. A.Ş. Beylikdüzü/İSTANBUL. **Reçete ile satılır.**

