

## Frenjinin Myosalvarsan ile tedavisine dair

Vienne-de Dr. Ignaz Prochnik.

(Med. Klin. 928-45)

**F**renjiye 10 senedenberi tutulup hiç bir tedavi yapmamış olan 34 yaşında bir hasta, 924 senesinde sağ göz kapağında *ptosis*(sukutu eçfan) ile beraber *diplopie*-ye düçar olur. Her biri 4 gram Neosalvarsan ve 15 gram bizmütten ibaret olmak üzere bir sene zarfında yapılan 3 seri şiddetli tedavi ve ikinci sene zarfında yapılan malarya tedavisi ile, bir seri Neosalvarsan sayesinde kan ve mayii nuhai şevkideki *Wassermann* taamülü menfi olur. Ahvali umumiye düzgün kalır ve *diplopie* kaybolur. 1928 senesinde, şiddetli teserruu kalp hecmeleri zuhûr eder: frengi hunnakı sadrı. Yine bir seri Neosalvarsan tatbiki-ne lüzum gördükse de, veritlerin bulunması pek güç olduğu cihetle, *Myosalvarsan*-a müracaat ettik. 30 santigram *Myo*-nun dördüncü zerkinden sonra, hecmeler daha nadir ve daha az şiddetle oldular. Dört gram *Myosalvarsan*-dan sonra, tedavi kesildi, tabibi müdavi, müstacel tehlikenin zail olmuş bulunduğuna karar verdi. Bu netice üzerine *Prochnik*, frengi iltihabı epheriyle müterafık olan, muahhar 3 frengi vak'asında *Myosalvarsan*-ı tecrübe etti. Netice, gerek objektif, gerekse subjektif olarak memnuniyeti mucip oldu. Umumiyetle şiryanı epher afetlerinde *Myosalvarsan* mutat mikdarlarda verilebildiği hâlde, Neosalvarsan büyük bir ihtiyat ve tedricen mütezaiyt mikdârlarla verilmelidir. Karhai sulbe 30 ve 45 lik ilk iki zerkte teneddüp etmez. Ancak, daha üç tane zerk yapılıncaya tamamiyle teneddüp etmiş olur. İkinci devir ârazı, 2-3 zerkte zail olur. Bu netice iki vak'ada ta-



kakkuk etti. Bazı defa zerk hizasında, saka doğru *irradiation*-lar ile müterafik, hafif bir veca zuhûr etti ve 24 saat zarfında vecanın tamamıyla zail olduğu görüldü. Bu hadiseden başka, ne mevziî ve ne de umumî bir reaksiyon görülmedi. *Prochnik*-e nazaran, *Myosalvarsan* tedavisi, ideal bir tedavi değildir. Yalnız, Neosalvarsana karşı muzadı istitbap mevcut olan vak'alarda, ondan istifade edilebilir.

## Vilâdî frengi

Prof. Dr. Edmon Nebel ve Dr. Herbet Orel.

(Prophylaxe der Wichtigsten-krankheiten  
des Kindesalters 1928).

**S**on on sene zarfında intişar eden tıbbî eserler, valdelerin tedavi edilmemiş frengilerinin çocuklar için pek büyük bir tehlike teşkil ettiğini gösteriyor. Müelliflerin bir istatistiğine nazaran, sıkıt ve çocukların ölü doğmasından dolayı, berhayat çocuk açığının, sağlam valdelere nisbette frengili valdelerde iki misli olduğunu göstermiştir. Hayatın ilk iki senesinde, tedavisiz kalan irsî frengili çocuklarda, vefiyat hiç olmazsa % 50 nisbetindedir. Bundan dolayı, valdeleri, hamilden evel ve hamil esnasında salvarsan, civa ve bismütte şiddetle tedavi etmek icap eder. Böyle bir tedaviye tâbi tutulan frengili valdelerde, sıkıt, vaktinden evel doğum ve ölü doğum vak'aları, sağlam kadınlardan fazla değildir. Aynı veçhile, frengili kadınlar tedaviye tâbi tutuldukları halde ondan çıkan çocuklar, intanlara fazla istidat göstermez. Bu tedavinin ehemmiyetini isbat zmnında, müellifler, Viyanada *Klaften* (Arch. f. gyn. 1926, cilt 128; 1920, cilt